



Covid-19 : Prise en charge d'un patient asymptomatique

Version au 28 novembre 2020

NB. Cas confirmé asymptomatique (par exemple RT-PCR + chez un cas contact asymptomatique) → Prise en charge identique aux cas symptomatiques

Cas contact au domicile

= Personne qui, en l'absence de mesures de protection efficaces* pendant toute la durée du contact, a partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé ou probable dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique).



Identifié par le médecin ayant pris en charge le cas confirmé ou probable (recueil d'informations sur [amelipro](#))

- RT-PCR ou test antigénique à réaliser immédiatement.
- Arrêt de travail si télétravail impossible.
- Prescription de masques chirurgicaux : 14 par semaine
- Isolement strict au domicile ou en centre d'hébergement
- Port du masque, lavage régulier des mains, surveillance température 2x/jour, surveillance des signes respiratoires

> Si RT-PCR ou test antigénique négatif : Isolement jusqu'au 7^{ème} jour après guérison clinique de tous les cas du domicile (arrêt à demander sur [declare.ameli.fr](#))
> Nouvelle RT-PCR ou nouveau test antigénique à J7: sortie d'isolement uniquement si négatif.

> Si RT-PCR ou test antigénique positif et/ou apparition de symptômes : Prise en charge comme un patient symptomatique

Cas contacts hors domicile

= Personne qui, en l'absence de mesures de protection efficaces* pendant toute la durée du contact, dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique):
. a eu un contact direct avec un cas confirmé ou probable, en face à face, à moins d'1 mètre du cas quelle que soit la durée ;
. a reçu ou prodigué des actes d'hygiène ou de soins ;
. a partagé un espace confiné (bureau, véhicule) pendant au moins 15 minutes ou lors de plusieurs épisodes de toux ;
. est élève ou enseignant de même classe scolaire ou groupe de TD universitaire.



Identifié par les services de l'Assurance maladie (+/- s'il le souhaite par le médecin ayant pris en charge le cas confirmé ou probable)

- RT-PCR ou test antigénique à réaliser entre J5 et J7 après le dernier contact avec le malade.
- Arrêt de travail si télétravail impossible (à demander sur [declare.ameli.fr](#))
- Prescription de masques chirurgicaux : 14 par semaine
- Isolement strict au domicile ou en centre d'hébergement
- Modalités identiques à celle des cas contacts au domicile

> Si RT-PCR ou test antigénique négatif : Levée de l'isolement.

> Si RT-PCR ou test antigénique positif et/ou apparition de symptômes : Prise en charge comme un patient symptomatique

- *Sont considérées comme mesures de protection efficaces :
- Hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ;
 - Masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ;
 - Masque grand public porté par le cas ET la personne contact

Personnes à risque de Covid-19 grave

Âge ≥ 65 ans, ATCD cardiovasculaires (HTA compliquée, AVC, coronaropathie, chir cardiaque, insuffisance cardiaque NYHA III ou IV), Diabète non équilibré ou avec complications, Pathologie respiratoire chronique, Dialyse, Cancer sous traitement (hors hormonothérapie), Obésité IMC > 30, Immunodépression, Cirrhose ≥ stade B, Syndrome drépanocytaire majeur ou splénectomie, Grossesse à partir du 3^{ème} trimestre, Maladie du motoneurone/myasthénie/SEP/Parkinson/tumeur cérébrale/maladie cérébelleuse/maladie rare



Si la personne ne souhaite pas reprendre le travail, et lorsque le télétravail est impossible: chômage partiel (si salarié) ou arrêt de travail (si non salarié).


Modalités:

> Si la personne est salariée du privé, son médecin traitant ou à défaut un médecin de ville lui délivre un certificat d'isolement sur le modèle suivant (sans date de terme): « Par la présente, je certifie que M/Mme X doit, compte-tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail ». Cette procédure peut être réalisée par voie de téléconsultation auquel cas le médecin adresse le certificat à l'assuré (par mail ou courrier) afin que celui-ci puisse le communiquer à son employeur.

> Pour les autres catégories : arrêt de travail pour isolement de préférence en ligne sur AmeliPro.

Proches de personnes à risque de Covid-19 grave

Aucune disposition particulière ne s'applique pour les personnes dans cette situation.



Garde d'enfants de moins de 16 ans

En cas de fermeture d'école ou enfant contact, et lorsque le télétravail est impossible: chômage partiel (salariés) ou arrêt de travail (autres professions).



Modalités : Le médecin généraliste n'intervient pas.

Salariés: Mise en activité partielle par l'employeur, sur la base de l'attestation délivrée par l'établissement

Autres catégories: Procédure réalisée par l'employeur sur [declare.ameli.fr](#) ou [declare.msa.fr](#)

Autres profils

= Pathologie chronique n'entrant pas dans les facteurs de risque officiels de forme grave (en ALD ou non), 1^{er} et 2^{ème} trimestres de grossesse, anxiété, etc.



Evaluer le risque lié à la pathologie, le cumul éventuel de facteurs de risques et l'exposition professionnelle

Avis médecine du travail si réticence patient ou doute sur risque

Indications et modalités d'arrêt de travail par le médecin généraliste : comme dans la pratique habituelle.