



# Covid-19 : Prise en charge d'un enfant

Version au 03 janvier 2022

## Enfant ayant des symptômes

Fièvre, toux, myalgies, asthénie inexplicquée, céphalées inhabituelles, anosmie sans rhinite associée, agueusie, altération de l'état général, diarrhée, fièvre isolée chez l'enfant de moins de 3 mois.



> Une autre étiologie peut-elle être affirmée?  
Angine strepto+, scarlatine, entérovirose, infection urinaire

*oui*

Traitement adapté  
Retour à l'école

*non*

Test antigénique ou RT-PCR immédiat

*Test négatif*

Retour à l'école  
Consignes de surveillance

*Test positif*

> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :  
**Isolement**  
**Test antigénique ou PCR à J5 :**  
- si négatif et disparition des symptômes > 48 h: isolement levé après 5 jours  
- si positif: sortie d'isolement après 7 jours

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :  
**Isolement**  
**Test antigénique ou PCR à J7 :**  
- si négatif et disparition des symptômes > 48 h: isolement levé après 7 jours  
- si positif: sortie d'isolement après 10 jours

## Enfant asymptomatique cas contact au domicile

Enfant qui, pendant toute la durée du contact, a partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé ou probable dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique).



> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :  
- **Pas d'isolement.** Limiter les interactions sociales.  
- **Test antigénique ou RT-PCR à réaliser immédiatement.**  
- Surveillance par **autotest (remis gratuitement en pharmacie) à J2 et J4** du dernier contact.  
  
- Si autotest positif: à confirmer par test antigénique ou PCR.  
Isolement dans l'attente du résultat

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :  
- **Isolement pendant 7 jours** après le dernier contact.  
- **Test antigénique ou PCR à J7**

## Enfant asymptomatique cas contact hors domicile

Enfant qui, dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique), a eu un contact direct avec un cas confirmé ou probable, en face à face, à moins d'1 mètre du cas quelle que soit la durée, lors d'une discussion, d'un repas, d'une accolade, d'un flirt (hors croisement fugace dans l'espace public) ; a reçu ou prodigué des actes d'hygiène ou de soins ; a partagé un espace confiné (bureau, véhicule) pendant au moins 15 minutes ou lors d'une toux ; ou est élève de même classe scolaire ou groupe de TD universitaire.



> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :  
- **Pas d'isolement.** Limiter les interactions sociales.  
- **Test antigénique ou RT-PCR à réaliser immédiatement.**  
- Surveillance par **autotest (remis gratuitement en pharmacie) à J2 et J4** du dernier contact.  
  
- Si autotest positif: à confirmer par test antigénique ou PCR.  
Isolement dans l'attente du résultat

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :  
- **Isolement pendant 7 jours** après le dernier contact.  
- **Test antigénique ou PCR à J7**

## Parent de l'enfant

En cas d'enfant contact ou de fermeture d'école et lorsque le télétravail est impossible:  
Le SMS reçu par l'Assurance Maladie vaut pour mise en chômage partiel ou autorisation spéciale d'absence pour les fonctionnaires Pour les travailleurs indépendants, aller sur [declare.ameli.fr](http://declare.ameli.fr) pour bénéficier d'un arrêt de travail garde d'enfant.

## Retour à l'école

**Pas de certificat de non contre-indication au retour à l'école.**

Les parents peuvent imprimer et remplir eux-mêmes [l'attestation suivante](#)

