



Covid-19 : Prise en charge d'un enfant

Version au 08 janvier 2022

Enfant ayant des symptômes

Fièvre, toux, myalgies, asthénie inexpliquée, céphalées inhabituelles, anosmie sans rhinite associée, agueusie, altération de l'état général, diarrhée, fièvre isolée chez l'enfant de moins de 3 mois.



> Une autre étiologie peut-elle être affirmée?
Angine strepto+, scarlatine, entérovirose, infection urinaire

oui

Traitement adapté
Retour à l'école

non

Test antigénique ou RT-PCR immédiat*

Test négatif

Retour à l'école
Consignes de surveillance

Test positif

> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :
Isolement
Test antigénique ou PCR* à J5 :
- si négatif et disparition des symptômes > 48 h: isolement levé après 5 jours
- si positif: sortie d'isolement après 7 jours

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :
Isolement
Test antigénique ou PCR* à J7 :
- si négatif et disparition des symptômes > 48 h: isolement levé après 7 jours
- si positif: sortie d'isolement après 10 jours

*Test nasal possible chez les moins de 12 ans, test salivaire chez les moins de 3 ans

Enfant asymptomatique cas contact au domicile

Enfant qui, pendant toute la durée du contact, a partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé ou probable dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique).



> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :
- **Pas d'isolement.** Limiter les interactions sociales.
- **Test antigénique ou RT-PCR* à réaliser immédiatement.**
- Surveillance par **autotest (remis gratuitement en pharmacie) à J2 et J4** du dernier contact.

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :
- **Isolement pendant 7 jours** après le dernier contact.
- **Test antigénique ou PCR* à J7**

*Test nasal possible chez les moins de 12 ans, test salivaire chez les moins de 3 ans

Enfant asymptomatique cas contact hors domicile

Enfant qui, dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique), a eu un contact direct avec un cas confirmé ou probable, en face à face, à moins d'1 mètre du cas quelle que soit la durée, lors d'une discussion, d'un repas, d'une accolade, d'un flirt (hors croisement fugace dans l'espace public) ; a reçu ou prodigué des actes d'hygiène ou de soins ; a partagé un espace confiné (bureau, véhicule) pendant au moins 15 minutes ou lors d'une toux ; ou est élève de même classe scolaire ou groupe de TD universitaire.



> Enfant avec schéma vaccinal complet ou enfant de moins de 12 ans :
- **Pas d'isolement.** Limiter les interactions sociales.
- **Test antigénique ou RT-PCR* à réaliser immédiatement.**
- Surveillance par **autotest (remis gratuitement en pharmacie) à J2 et J4** du dernier contact.

> Enfant de plus de 12 ans avec schéma vaccinal incomplet ou non vacciné :
- **Isolement pendant 7 jours** après le dernier contact.
- **Test antigénique ou PCR* à J7**

*Test nasal possible chez les moins de 12 ans, test salivaire chez les moins de 3 ans

Parent de l'enfant

En cas d'enfant contact ou de fermeture d'école et lorsque le télétravail est impossible:
Le SMS reçu par l'Assurance Maladie vaut pour mise en chômage partiel ou autorisation spéciale d'absence pour les fonctionnaires Pour les travailleurs indépendants, aller sur declare.ameli.fr pour bénéficier d'un arrêt de travail garde d'enfant.

Retour à l'école

Pas de certificat de non contre-indication au retour à l'école.

Les parents peuvent imprimer et remplir eux-mêmes [l'attestation suivante](#)

