



MÉMO VACCINATION

Données synthétiques
**pour la pratique
vaccinale
à partir de 25 ans**

hors Covid-19



Tous les adultes doivent recevoir ou avoir reçu les vaccins suivants :

- **dTP** (Diphtérie d, Tétanos, Poliomyélite) **ou dTcaP** (Diphtérie d, Tétanos, Coqueluche ca, Poliomyélite)
- **ROR** (Rougeole/oreillons/Rubéole - nés à partir de 1980)

Selon les facteurs de risque et situations particulières
les vaccins suivants sont **nécessaires** :

- Grippe
- Haemophilus influenzae : Hib
- Hépatite A : Hep A
- Hépatite B : Hep B
- Papillomavirus Humains : HPV
- Pneumocoque : PnC
- Rougeole/oreillons/Rubéole : ROR
- Méningocoque B : MnB
- Méningocoque ACWY
- Varicelle (à partir de 12 ans si pas immunisé par la maladie)
- Virus respiratoire syncytial
- Zona



Quels vaccins sont sur le marché **en France** ?

- **dTcaP** (quadrivalent atténué) : Boostrixtetra® / Repevax®
- **Grippe** : Vaxigrip tetra® / Influvac tetra® / Fluarix tetra®
- **Hib** : Act-Hib®
- **HPV** : Gardasil 9®
- **Hep A** : Avaxim® 160 U / Havrix® 1440 U / Vaqta® 50 U
- **Hep B** : Engerix® B20 µg / HBVaxpro® 10 µg
- **MnB** : Bexsero® / Trumenba®
- **MnC** : Menjugate® / Neisvac®
- **Méningocoque ACWY** : Nimenrix® / Menveo® / MenQuadfi®
- **PnC** : Prevenar 20® / Pneumovax®
- **ROR** : MMRVaxPro® / Priorix®
- **Varicelle** : Varilrix® / Varivax®
- **VRS** : Abrysvo® / Arexvy® / mResvia®
- **Zona** : Schingrix®

Situations particulières

Grossesse

- **Grippe** : quel que soit le stade de la grossesse.
- **Coqueluche** : à partir du deuxième trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée (SA). Le vaccin coquelucheux est disponible uniquement en association aux valences dTP. Un délai minimum d'un mois devra être respecté avec un précédent vaccin dTP.
- **VRS** : entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée avec le vaccin Abrysvo®

Facteurs de risques d'infection invasive à Pneumocoque

Prevenar 20®. Vérifier le délai si la personne a reçu antérieurement une vaccination anti-pneumococcique.

Varicelle

Dans les 3 jours suivant un contact avec un cas de varicelle ou de zona pour toute personne immunocompétente (à l'exclusion des femmes enceintes), sans antécédents de varicelle ou de vaccination contre la varicelle.

Hépatite A

- Pour les personnels exposés professionnellement à un **risque de contamination** :
 - s'occupant d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la propreté (par exemple personnels des crèches, assistants maternels...) ;
 - des structures collectives d'accueil pour personnes handicapées ;
 - chargés du traitement des eaux usées et des égouts.
- Pour les professionnels impliqués dans la **préparation alimentaire en restauration collective**.
- Pour les **hommes** ayant des **relations sexuelles avec des hommes** (HSH).

Patients immunodéprimés ou aspléniques

- **Patients aspléniques** : vaccins Méningocoque ACWY+MnB+PnC+Hib.
- **Patients immunodéprimés** : recommandation du HCSP (bit.ly/rechHCSP)



Les vaccins du voyageur ne sont pas abordés ici.

Les recommandations sont consultables sur le site de Vaccination Info Service : bit.ly/vaccinfoservice et Santé publique France : bit.ly/beh02062022

Quel vaccin à quel âge ?

En dehors des rattrapages et situations particulières

25 ans	dTPca
45 ans	dTP ¹ (dTPca si entourage de nourrisson non vacciné contre la coqueluche)
65 ans	dTP ¹ + grippe chaque année + éventuellement Zona
75 ans	dTP ¹ (puis tous les 10 ans) - éventuellement VRS

	25 ans	45 ans	65 ans	75 ans
dTPca^①	●	●	●	●
Grippe^②			●	●
VRS^③				●
Zona^④			●	●

Source : <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>

① Utiliser le dTPca en l'absence de disponibilité du dTP.

② Une dose annuelle.

③ À partir de 65 ans pour les personnes à risque.

④ Une injection unique. La nécessité d'une dose de rappel n'est actuellement pas connue.